



Preguntas frecuentes acerca de la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo y el posparto

1

¿A partir de qué semana del embarazo puedo aplicarme la vacuna?

Puedes aplicarte la vacuna **desde la semana 12 del embarazo y hasta los primeros 40 días luego del parto**. La vacuna aprobada en el país durante esta etapa es la de **Pfizer**.

2

¿Cuáles son los riesgos de no aplicarme esta vacuna?

Tienes mayor probabilidad de contraer COVID19 y enfermarte gravemente, lo que en algunos casos implica el ingreso a UCI y aumenta el riesgo de complicaciones para ti y tu bebé.

3

¿Qué síntomas puedo presentar después de aplicarme la vacuna?

Como con otras vacunas, puedes tener un poco de dolor en el brazo, enrojecimiento o hinchazón en la zona de aplicación. En algunas ocasiones dolor de cabeza o escalofríos. **Si presentas algún síntoma comunícate con nuestras líneas de atención en Bogotá: 3759000, Nacional: 018000919100.**

4

¿Puedo aplicarme la vacuna si estoy lactando a mi bebé?

Si, te puedes vacunar. Durante la lactancia no existe contraindicación para la aplicación de esta vacuna, luego de los 40 días postparto se puede aplicar cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID19.

5

¿Si tuve COVID19, me puedo aplicar la vacuna?

Si, puedes aplicarte la **primera dosis de la vacuna 30 días después del diagnóstico de COVID19**. Los 30 días se cuentan a partir del primer día de inicio de síntomas si presentaste, o a partir del resultado de la prueba positiva si no tuviste síntomas.

6

¿Me puedo aplicar el mismo día la vacuna contra la Influenza y la Td (Toxoide tetánico y diftérico)?

Te puedes **aplicar el mismo día la vacuna contra la Influenza**. Sin embargo, debes esperar **15 días para aplicarte la vacuna Td (Toxoide tetánico y diftérico)**.


La vacuna contra el COVID19 durante el embarazo y postparto **reduce el riesgo de enfermedad grave, pero no previene el contagio**, por lo que debes continuar y reforzar las medidas que nos mantienen protegidos del Coronavirus:



Lavado de manos.



Uso de tapabocas.



Distanciamiento físico.



Ventilación en espacios cerrados

#Vacunarteesalvavidas