

Nuestro compromiso es **cuidar la salud de toda tu familia**



Conoce el esquema general de vacunación en Colombia para que tú y tu familia se mantengan protegidos contra virus y enfermedades.



Para niños entre 0 a 18 meses

Recién nacidos	>	- BCG (tuberculosis meningea) - Hepatitis B
1 mes y medio	>	Primera dosis de: - Pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, Hib y hepatitis B) - Polio - Rotavirus - Neumococo
3 meses	>	Segunda dosis de: - Pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, Hib y hepatitis B) - Polio - Rotavirus - Neumococo
4 meses y medio	>	Tercera dosis de: - Pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, Hib y hepatitis B) - Polio
6 meses	>	- Primera dosis de influenza estacional - Dosis Cero Sarampión y Rubéola (SR/SRP)
7 meses	>	Segunda dosis de influenza estacional
9 meses	>	Fiebre amarilla
12 meses	>	- Primera dosis triple viral - Primera dosis varicela - Hepatitis A - Refuerzo neumococo
18 meses	>	- Refuerzo polio - Refuerzo de pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, Hib, hepatitis B) - Segunda dosis triple viral



Niños y niñas de 2 a 14 años

2 a 5 años	>	- Refuerzo de triple viral para quienes ya cuentan con la primera dosis. - Si ya cuenta con la segunda dosis de triple viral no es necesario aplicarla.
5 años	>	- DPT - Segundo refuerzo polio - Segunda dosis varicela
6 a 15 años	>	Sarampión y rubéola para quienes no hayan recibido la dosis adicional de la vacuna.



Vacunación contra la fiebre amarilla

Dosis principal

- Se aplica a personas desde los 9 meses hasta los 59 años. Para personas mayores de 60 años residentes o viajeros a zonas de riesgo se debe contar con indicación médica.
- Mujeres a partir de la semana 12 de gestación que viven en veredas del Tolima con circulación activa del virus*
- Cuando viajes a zonas de riesgo o al exterior, aplícatela mínimo 10 días antes

Dosis de refuerzo:

Aplica para personas que viven o se desplazan a municipios priorizados en Tolima y presentan alguna de las siguientes condiciones:

- Vacunación contra la fiebre amarilla hace más de 10 años.
- Si se recibió la vacuna durante la gestación, refuerzo a los 6 meses después del parto
- Personas con antecedentes de VIH o trasplante de células madre. Para estos casos se debe consultar con el médico tratante



Municipios priorizados en Tolima:

Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.

Circular externa 045 del 31 de diciembre 2025 - MSPS • Circular externa 001 del 2026 - MSPS



Consulta aquí
las zonas de riesgo en Colombia

Otras vacunas para el resto de la familia

- Niños y adolescentes de 9 a 17 años**
Única dosis contra el VPH.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años**
Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)
- Adultos mayores de 60 años**
Influenza estacional



Asiste a tu punto de vacunación más cercano. Ten en cuenta que todas las vacunas del esquema son gratuitas.

El cuidado lo hacemos juntos.